


Ficha educativa sobre los efectos secundarios de los medicamentos para recién nacidos

Nombre del paciente: _____

¿Para qué lo usamos? El medicamento es para:	¿Cuál es el medicamento del bebé? Nombre del medicamento: genérico (marca)	¿Cuáles son los posibles efectos secundarios COMUNES?
TODOS LOS RECIÉN NACIDOS		
PREVENCIÓN DE INFECCIONES OCULARES DESPUÉS DEL NACIMIENTO 	<ul style="list-style-type: none"> Eritromicina oftálmica (ungüento) 	<ul style="list-style-type: none"> Enrojecimiento de los ojos
<ul style="list-style-type: none"> Otro: 		
PREVENCIÓN DE HEMORRAGIAS DESPUÉS DEL NACIMIENTO 	<ul style="list-style-type: none"> Administración intramuscular de vitamina K 	<ul style="list-style-type: none"> Enrojecimiento en el lugar de la inyección
<ul style="list-style-type: none"> Otro: 		
PREVENCIÓN DE LA HEPATITIS B (INFECCIÓN DEL HÍGADO) 	<ul style="list-style-type: none"> Vacuna para la hepatitis B (sin timerosal, derivado del mercurio, ni conservantes) 	<ul style="list-style-type: none"> Enrojecimiento o dolor en el lugar de la inyección Irritabilidad
<ul style="list-style-type: none"> Otro: 		
DOLOR Y PROCEDIMIENTOS DOLOROSOS 	<ul style="list-style-type: none"> Administración oral de sacarosa al 24 % (dulces) 	<ul style="list-style-type: none"> Somnolencia
<ul style="list-style-type: none"> Otro: 		
SOLO PARA LA UCIN		
DOLOR Y PROCEDIMIENTOS DOLOROSOS 	<ul style="list-style-type: none"> Administración intravenosa de sulfato de morfina Administración intravenosa de fentanilo 	<ul style="list-style-type: none"> Disminución del ritmo respiratorio Disminución de la presión arterial
<ul style="list-style-type: none"> Otro: 		
AGITACIÓN DIFICULTAD PARA RESPIRAR 	<ul style="list-style-type: none"> Administración intravenosa de lorazepam (Ativan) 	<ul style="list-style-type: none"> Disminución del ritmo respiratorio Dolor o molestia en el lugar de la inyección
<ul style="list-style-type: none"> Otro: 		

Ficha educativa sobre los efectos secundarios de los medicamentos para recién nacidos

¿Para qué lo usamos? El medicamento es para:	¿Cuál es el medicamento del bebé? Nombre del medicamento: genérico (marca)	¿Cuáles son los posibles efectos secundarios COMUNES?
SOLO PARA LA UCIN		
<p>NIVEL NORMAL DE GLÓBULOS ROJOS Y PREVENCIÓN DE ANEMIA</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Fe (Hierro) • Epoetina alfa (Epogen) • Otro: 	<ul style="list-style-type: none"> • Estreñimiento • Heces negras • Somnolencia
<p>CRECIMIENTO Y DESARROLLO: HUESOS Y MÚSCULOS SANOS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ergocalciferol (vitamina D) • Multivitamínico (Poly-Vi-Sol) • Otro: 	<ul style="list-style-type: none"> • Vómitos • Somnolencia, debilidad
<p>TRATAMIENTO CONTRA LA INFECCIÓN: ACTIVA O PRESUNTA</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Administración intravenosa de ampicilina • Administración intravenosa de gentamicina (Garamycin) • Otro: 	<ul style="list-style-type: none"> • Puede afectar las pruebas de orina. Se deben controlar los resultados de laboratorio • Puede afectar las pruebas de orina. Se deben controlar los resultados de laboratorio • Puede afectar la audición. Se necesitarán estudios de audición • Se deben controlar los niveles sanguíneos cuando tome este medicamento
<p>AYUDA RESPIRATORIA</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Poractant alfa (Curosurf) • Otro: 	<ul style="list-style-type: none"> • Disminución de la frecuencia cardíaca • Disminución de la presión arterial • Disminución del nivel de oxígeno durante la administración del medicamento